



IMPfung

| | HUND | KATZE | KANINCHEN |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| GRUNDIMMUNISIERUNG 1. Impfung | 8 LW SHPL | 8 LW PHC | 4-10 LW RHD 4 LW Myxomatose |
| GRUNDIMMUNISIERUNG 2. Impfung | 12 LW SHPLT | 12 LW PTHC | 8-14 LW RHD 8 LW Myxomatose |
| JÄHRLICHE AUFFRISCHUNG | SHPLT | PTHC | RHD Myxomatose |

ENTWURMUNG

Bei Hund und Katze kommen Rund- und Bandwürmer vor. Nicht jedes Wurmmittel ist gegen beide Wurmartens wirksam.

Hunde- und Katzenwelpen werden ab der 4. LW alle zwei Wochen bis ca. zur 12. LW gegen Spulwürmer und Hakenwürmer behandelt. Dafür eignet sich z.B. die Pyrantel-Paste.

Erwachsene Katzen sollten alle 3 Monate ein Präparat erhalten, das sowohl gegen Rund- als auch Bandwürmer wirkt. Tabletten sowie Spot-on-Präparate sind erhältlich. Bei Katzen, die fleißig Mäuse fangen, ist die Entwurmung gegen Bandwürmer häufig in kürzerem Abstand notwendig.

Erwachsene Hunde sollten mind. 2 x im Jahr mit einem Kombinations-Präparat behandelt werden.

Achtung: Bayern ist Endemiegebiet für den Fuchsbandwurm. Dieser kann beim Menschen ernsthafte Erkrankungen hervorrufen. Wir empfehlen bei jagdlich geführten Hunden, sowie bei allen Hunden, die viel auf Feldern und im Wald ausgeführt werden, jeden Monat eine Wurmprophylaxe mit Praziquantel gegen den Fuchsbandwurm durchzuführen.

Achtung: Für Reisen ins Ausland ist ein EU-Impfpass und Chip gesetzlich vorgeschrieben.

| | | |
|------|---|---|
| SHPL | = | Staupe / Hepatitis / Parvovirose / Leptospirose |
| T | = | Tollwut |
| PHC | = | Katzenschnupfen / Katzenseuchenkomplex |
| RHD | = | Rabbit Hemorrhagic Disease |
| LW | = | Lebenswoche |